MISE EN ROUTE DU TRAITEMENT

Votre guide sur LUMAKRAS[MD]

LUMAKRAS a été approuvé avec conditions (AC-C). Cela signifie qu'il a été autorisé, après examen, par Santé Canada et peut être acheté et vendu au Canada, mais que le fabricant a accepté d'effectuer d'autres études pour confirmer que le médicament fonctionne comme il se doit.

LUMAKRAS est utilisé pour le traitement des adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) présentant une anomalie génétique appelée « mutation *KRAS G12C* », lorsque ce cancer :

- ne peut pas être enlevé par chirurgie ou par une autre forme de traitement, ou s'est propagé à d'autres parties de l'organisme;
- a été traité auparavant par au moins un type de traitement contre le cancer.

Votre professionnel de la santé vous fera passer des examens afin de déterminer si votre cancer présente la mutation *KRAS G12C* et s'assurera que le traitement par LUMAKRAS vous convient.

LUMAKRAS n'est pas approuvé pour une utilisation chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

AMGEN

PrLUMAKRAS[MD]
comprimés de sotorasib

Avant de commencer à prendre LUMAKRAS

Pour vous simplifier la vie, notez tous les renseignements concernant votre traitement au même endroit. Commencez par entrer les renseignements suivants. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi noter d'autres éléments liés à votre traitement.

Liste des personnes-ressources

	Numéro de téléphone	Courriel
Docteur/oncologue :		
Infirmière :		
Pharmacien :		
Responsable de l'accès aux médicaments :		

Renseignements sur l'assurance

Assureur, détails du régime	Numéro de téléphone/télécopieur

Vous avez des questions sur votre diagnostic et vos traitements? Notez-les ici et apportez cette liste à votre prochain rendez-vous. Nous avons ajouté des questions que les patients se posent fréquemment. N'hésitez pas à ajouter les vôtres.

Questions

Questions importantes pour mon professionnel de la santé	
Quel traitement me donnez-vous?	
À quoi ce traitement sert-il?	
Comment ce traitement agit-il?	
Quels sont les effets secondaires potentiels de ce traitement?	

Notes

Commencer le traitement par LUMAKRAS

Établir une nouvelle routine de traitement est parfois un défi, mais voici un guide qui peut vous aider à entreprendre votre traitement.

Votre **guide sur LUMAKRAS** est conçu pour vous aider, votre équipe soignante et vous, à collaborer tout au long de votre traitement.

Le but est de rendre votre expérience du traitement aussi simple que possible en vous :

- aidant à planifier des détails importants pour votre plan de traitement;
- renseignant sur votre médicament et sur les façons de reconnaître et d'aborder les effets secondaires;
- offrant des conseils pour faciliter votre parcours thérapeutique.

Avec ce guide, vous recevrez aussi de l'information sur le programme VICTOIRE[MD] (offert par les services de soutien aux patients Amgen Entrust[MD]) et l'aide que ce programme peut vous apporter.

Nous sommes conscients que vous pourriez avoir des questions.

Nous sommes là pour y répondre!

LUMAKRAS est utilisé pour le traitement des adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules présentant une anomalie génétique appelée « mutation *KRAS G12C* », lorsque ce cancer ne peut pas être enlevé par chirurgie ou par une autre forme de traitement, ou s'est propagé à d'autres parties du corps, et a été traité auparavant par au moins un type de traitement contre le cancer.

« Comment puis-je savoir que j'ai un cancer avec une anomalie génétique appelée "mutation KRAS G12C"*? »*

Votre professionnel de la santé a vérifié si votre cancer porte la mutation anormale *KRAS G12C* et a déterminé que LUMAKRAS est approprié pour vous.

« Comment LUMAKRAS agit-il? »

LUMAKRAS contribue à faire obstacle à la protéine KRAS G12C anormale dans votre cancer du poumon, ce qui peut ralentir ou interrompre la croissance et la propagation du cancer du poumon.

Si vous avez des questions au sujet de la façon dont LUMAKRAS agit ou des raisons pour lesquelles il vous a été prescrit, n'hésitez pas à les poser à votre professionnel de la santé.

Prendre LUMAKRAS

Dose recommandée



La dose habituelle de LUMAKRAS est de 960 mg (4 comprimés de 240 mg) prise une fois par jour

Si vous présentez des effets secondaires graves ou si votre maladie s'aggrave, votre professionnel de la santé pourrait réduire votre dose, interrompre votre traitement pendant un certain temps ou vous recommander de mettre fin à votre traitement définitivement.

Comment prendre votre médicament



Antiacide
Si vous avez besoin de prendre un antiacide (pour réduire l'acidité de l'estomac), prenez LUMAKRAS 4 heures avant ou 10 heures après l'antiacide*.



Prenez vos comprimés **avec ou sans nourriture**.



Avalez les comprimés entiers. Il ne faut pas croquer, écraser ni diviser les comprimés.



Prenez vos comprimés **tous les jours à la même heure**.

Si vous n'arrivez pas à avaler vos comprimés LUMAKRAS entiers, lisez et suivez les instructions ci-dessous.



Mettez votre dose quotidienne de LUMAKRAS dans un verre contenant 120 mL (4 onces) d'eau non gazéifiée à la température ambiante, sans écraser les comprimés.



N'utilisez aucun autre liquide que de l'eau non gazéifiée à la température ambiante.



Remuez le mélange jusqu'à ce que les comprimés soient en petits morceaux (les comprimés ne se dissoudront pas complètement). Le mélange sera de couleur jaune plus ou moins foncé.



Buvez le mélange d'eau et de LUMAKRAS immédiatement.



Versez de nouveau 120 mL (4 onces) d'eau dans le verre et buvez le contenu du verre immédiatement pour vous assurer de prendre la dose complète de LUMAKRAS.



Si vous ne buvez pas le mélange immédiatement, mélangez-le de nouveau. Buvez-le dans les 2 heures qui suivent sa préparation.



Si vous avez une sonde d'alimentation, votre professionnel de la santé vous indiquera comment prendre le médicament.

* Les médicaments utilisés pour réduire l'acidité dans l'estomac et traiter les ulcères d'estomac, les troubles digestifs et les brûlures d'estomac – par exemple le dexlansoprazole, l'ésoméprazole, le lansoprazole, l'oméprazole, le pantoprazole sodique ou le rabéprazole (des médicaments appelés « inhibiteurs de la pompe à protons »), ainsi que la ranitidine, la famotidine ou la cimétidine (des médicaments appelés « antagonistes des récepteurs H_2 ») – pourraient être associés à des interactions médicamenteuses avec LUMAKRAS.

D’autres questions?

« Puis-je arrêter de prendre mon médicament? »

Ne changez pas votre dose et n’arrêtez pas de prendre LUMAKRAS à moins que votre professionnel de la santé vous dise de le faire. Rappelez-vous de toujours prendre LUMAKRAS exactement comme votre professionnel de la santé vous a dit de le faire.

« Que dois-je faire si j’ai oublié de prendre ma dose de LUMAKRAS? »

Ne prenez pas la dose s’il s’est écoulé 6 heures ou plus depuis l’heure à laquelle vous prenez votre médicament habituellement. Prenez votre prochaine dose au moment prévu.

« Que dois-je faire si j’ai pris trop de LUMAKRAS? »

Si vous pensez que vous avez pris trop de LUMAKRAS, contactez immédiatement un professionnel de la santé, le service des urgences d’un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même si vous n’avez aucun symptôme. Vous devez communiquer immédiatement avec votre professionnel de la santé si vous avez pris plus de comprimés LUMAKRAS que ce qui vous a été recommandé.

« Que dois-je faire si je vomis après avoir pris ma dose de LUMAKRAS? »

Ne prenez pas une dose supplémentaire si vous vomissez après avoir pris LUMAKRAS. Prenez votre prochaine dose au moment prévu.



Si vous ne savez pas comment prendre LUMAKRAS, vérifiez avec votre professionnel de la santé.

Ce que vous devez savoir avant de commencer à prendre LUMAKRAS

Afin de réduire le risque d'effets secondaires et d'assurer l'utilisation adéquate de votre médicament, mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment si vous :

- avez actuellement ou avez déjà eu des problèmes touchant le foie;
- avez actuellement ou avez déjà eu des problèmes touchant les poumons;
- avez une intolérance au lactose.

Autres mises en garde et précautions

Problèmes touchant le foie

Une hépatotoxicité (dommage au foie), y compris des lésions hépatiques et une hépatite (inflammation du foie), peut survenir chez les patients qui prennent LUMAKRAS. Une hausse des taux d'enzymes hépatiques peut également se produire. Le risque de présenter des lésions au foie est plus élevé si vous avez reçu une immunothérapie au cours des 3 mois précédant le début du traitement par LUMAKRAS.

Vous ferez l'objet d'analyses de sang régulièrement, soit avant de commencer votre traitement par LUMAKRAS, toutes les 3 semaines au cours des 3 premiers mois du traitement, puis tous les mois par la suite. Selon votre état de santé, vous pourriez avoir besoin d'autres analyses qui aideront votre professionnel de la santé à vérifier le fonctionnement de votre foie.

Problèmes touchant les poumons ou la respiration

Une pneumopathie interstitielle ou une pneumonite (inflammation ou formation de tissu cicatriciel dans les poumons) peuvent survenir pendant le traitement par LUMAKRAS et sont susceptibles d'entraîner la mort. Le risque de présenter des problèmes touchant les poumons ou la respiration est plus élevé si vous avez reçu une immunothérapie au cours des 3 mois précédant le début du traitement par LUMAKRAS. Communiquez avec votre professionnel de la santé en cas d'apparition ou d'aggravation d'un essoufflement, de la toux ou de la fièvre. Si ces symptômes deviennent graves, obtenez immédiatement des soins médicaux.

Les signes et symptômes de problèmes touchant le foie et les poumons sont décrits dans la section **Effets secondaires graves et mesures à prendre** à la page 10.

Pour les femmes

Grossesse, contraception et allaitement

- Si vous êtes enceinte, si vous pouvez devenir enceinte ou si vous pensez l'être, informez-en votre professionnel de la santé. Vous devriez discuter de risques particuliers avec votre professionnel de la santé.
- Si vous devenez enceinte ou si vous soupçonnez être enceinte pendant votre traitement par LUMAKRAS, informez-en votre professionnel de la santé immédiatement.
- N'allaitez pas pendant que vous prenez LUMAKRAS et pendant au moins 1 semaine après la prise de votre dernière dose.

Renseignements importants sur l'innocuité

Effets secondaires possibles

Lors de la prise de médicaments, il est important de connaître les effets secondaires qui pourraient se présenter. Voici certains des effets secondaires possibles que vous pourriez présenter lorsque vous prenez LUMAKRAS : diarrhée, nausées, vomissements, sensation de fatigue, toux, douleur à l'estomac, constipation, diminution de l'appétit, douleur articulaire, éruption cutanée.

Si vous présentez des effets secondaires qui ne font pas partie de cette liste, avisez votre professionnel de la santé.

LUMAKRAS peut entraîner des résultats anormaux aux analyses de sang. Votre professionnel de la santé effectuera des analyses de sang pendant votre traitement. Ces analyses aideront votre professionnel de la santé à voir les effets de LUMAKRAS sur votre sang et votre foie.

Notez vos effets secondaires. Discutez de tous les effets secondaires avec votre professionnel de la santé dès que vous le pouvez, surtout s'ils sont graves ou s'ils persistent.

Suivi des effets secondaires

Date de la première observation	Description de l'effet secondaire	
5 mai	*Fatigue*	
Sévérité ☺ 1 2 3 **4** 5 ☹	Fréquence ☺ 1 2 **3** 4 5 ☹	Répercussions au quotidien ☺ 1 2 3 4 **5** ☹
Notes :		
1 : très faible(s); 2 : faible(s); 3 : modérée(s); 4 : élevée(s); 5 : très élevée(s)		

Inscrivez la date à laquelle vous avez observé l'effet secondaire pour la première fois.

Encerclez le chiffre approprié pour évaluer la **sévérité** et la **fréquence** de vos symptômes et leurs **répercussions sur vos activités quotidiennes**.

Décrivez vos symptômes.

Utilisez l'espace réservé aux **notes** pour inscrire tout renseignement supplémentaire à propos des effets secondaires.

Voir la page 11 pour des conseils sur la prise en charge des effets secondaires.

Date de la première observation	Description de l'effet secondaire	
Sévérité ☺ 1 2 3 4 5 ☹	Fréquence ☺ 1 2 3 4 5 ☹	Répercussions au quotidien ☺ 1 2 3 4 5 ☹
Notes :		

Date de la première observation	Description de l'effet secondaire	
Sévérité ☺ 1 2 3 4 5 ☹	Fréquence ☺ 1 2 3 4 5 ☹	Répercussions au quotidien ☺ 1 2 3 4 5 ☹
Notes :		

Date de la première observation	Description de l'effet secondaire	
Sévérité ☺ 1 2 3 4 5 ☹	Fréquence ☺ 1 2 3 4 5 ☹	Répercussions au quotidien ☺ 1 2 3 4 5 ☹
Notes :		

Date de la première observation	Description de l'effet secondaire	
Sévérité ☺ 1 2 3 4 5 ☹	Fréquence ☺ 1 2 3 4 5 ☹	Répercussions au quotidien ☺ 1 2 3 4 5 ☹
Notes :		

Date de la première observation	Description de l'effet secondaire	
Sévérité ☺ 1 2 3 4 5 ☹	Fréquence ☺ 1 2 3 4 5 ☹	Répercussions au quotidien ☺ 1 2 3 4 5 ☹
Notes :		

Date de la première observation	Description de l'effet secondaire	
Sévérité ☺ 1 2 3 4 5 ☹	Fréquence ☺ 1 2 3 4 5 ☹	Répercussions au quotidien ☺ 1 2 3 4 5 ☹
Notes :		

Renseignements importants sur l'innocuité

Effets secondaires graves et mesures à prendre

Dans les cas graves seulement, consultez votre professionnel de la santé	Dans tous les cas, consultez votre professionnel de la santé
Très fréquents	
• **Diarrhée** • **Œdème** (enflure inhabituelle des bras, des mains, des jambes, des pieds, des chevilles, du visage ou des voies respiratoires) • **Nausées** • **Douleurs musculosquelettiques** (douleurs touchant les muscles, les tendons et les os) : douleur musculaire, douleur aux membres, douleur articulaire et douleur osseuse • **Vomissements**	• **Hépatotoxicité** (gonflement du foie), **hépatite** (inflammation du foie) **ou lésion hépatique** : jaunisse (jaunissement de la peau ou du blanc des yeux), urine foncée, selles pâles, perte d'appétit pendant quelques jours ou plus, nausées, douleur au bas de l'abdomen, fièvre, fatigue, faiblesse, vomissements
Fréquents	
	• **Embolie pulmonaire** (caillot de sang dans les poumons) : douleur à la poitrine pouvant augmenter avec une inspiration profonde, toux, présence de sang dans le crachat, essoufflement • **Problèmes touchant les poumons ou la respiration** (pneumonie, pneumonite, pneumopathie interstitielle) : apparition ou aggravation de problèmes pulmonaires, difficulté à respirer, essoufflement, douleur à la poitrine, toux, accumulation de liquide dans les poumons ou fièvre

En cas de symptôme ou d'effet secondaire gênant non mentionné ci-dessus ou d'aggravation d'un symptôme ou d'un effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Conseils pour vous aider à prendre en charge certains des effets secondaires possibles

Diarrhée	○ **Buvez beaucoup de liquides clairs** (p. ex., de l'eau, des boissons de rééquilibration électrolytique) pour prévenir la déshydratation (perte des liquides corporels). ○ **Prenez de petits repas** faciles à digérer. ○ **Évitez les aliments et boissons pouvant irriter votre tube digestif** (p. ex., alcool, boissons contenant de la caféine ou du chocolat, produits laitiers, aliments marinés et épicés, aliments riches en gras, aliments riches en fibres, aliments et boissons très sucrés). ○ **Discutez avec votre médecin**, qui peut vous prescrire un médicament contre la diarrhée.
Nausées	○ **Buvez beaucoup d'eau et de liquides** pour prévenir la déshydratation. Essayez de boire de petites gorgées d'eau tout au long de la journée. ○ **Évitez certains aliments.** Ne mangez pas d'aliments gras, frits, sucrés ou épicés si vous ressentez un malaise après les avoir consommés. Si l'odeur des aliments vous dérange, demandez à quelqu'un de vous les préparer. ○ **Discutez avec votre médecin**, qui peut vous prescrire un médicament contre les nausées. ○ **Renseignez-vous sur les pratiques de médecine complémentaire qui peuvent vous aider.** L'acupuncture, la respiration profonde et d'autres techniques de relaxation (comme le fait d'écouter de la musique ou de méditer) peuvent vous aider.
Fatigue	○ **Trouvez le bon équilibre entre repos et activité.** Choisissez des activités que vous trouvez relaxantes. Votre médecin pourrait également vous conseiller de l'activité physique légère. ○ **Prévoyez du temps pour vous reposer.** Si vous êtes fatigué, faites de courtes siestes de moins d'une heure pendant la journée. Demandez de l'aide pour effectuer des tâches importantes comme la préparation des repas ou la conduite automobile. ○ **Mangez bien et buvez beaucoup.** Les aliments riches en protéines et en calories vous aideront à garder vos forces.
Toux	○ **Notez la fréquence et le moment** où vous toussez. ○ **Faites le suivi de votre toux** pour aider votre professionnel de la santé à déterminer une option de traitement appropriée.
Douleurs aux muscles et aux os	○ **Notez** où la douleur a commencé, sa durée, ce qui la soulage, ce qui l'aggrave et comment elle affecte votre vie quotidienne. ○ **Parlez de la douleur à votre professionnel de la santé** pour l'aider à déterminer un plan de traitement approprié.

Autres renseignements importants à garder à l'esprit

Interactions potentielles avec d'autres médicaments

Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez, y compris les médicaments sur ordonnance ou en vente libre, les vitamines, les minéraux, les suppléments à base de plantes médicinales et les produits de médecine douce, car ces produits pourraient interagir avec LUMAKRAS.

Veuillez consulter le feuillet « Renseignements sur le médicament pour le patient » fourni avec LUMAKRAS pour connaître les interactions potentielles avec d'autres médicaments.

Balayer pour voir les renseignements sur LUMAKRAS pour le patient

Entreposage de LUMAKRAS



Conservez à une température ambiante de 15 à 30 °C.



Gardez hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne jetez pas votre médicament dans la toilette ni dans les ordures. Demandez à votre pharmacien comment mettre vos médicaments au rebut de façon appropriée.

Conseils pour intégrer plus facilement LUMAKRAS à votre routine



Utilisez un aide-mémoire. Laissez-vous des notes bien en vue pour vous rappeler de prendre votre dose. Choisissez un endroit passant comme la salle de bain ou la cuisine.



Fixez un moment qui fonctionne pour vous. Associez la prise de votre dose habituelle à une activité quotidienne. Placez votre médicament dans un endroit sûr et facile à trouver afin de pouvoir le prendre à la même heure chaque jour. Un truc : jumelez votre dose à une activité répétée tous les jours, comme vous brosser les dents.



Notez chaque dose. Gardez un calendrier dans un endroit visible (p. ex., sur le frigo) et faites-y une marque lorsque vous prenez votre dose quotidienne. Ainsi, vous risquerez moins d'oublier une dose ou de dépasser la quantité recommandée.



Utilisez une alarme sur votre cellulaire ou sur une horloge. Réglez une alarme qui se déclenche tous les jours. Assurez-vous de choisir un moment où vous aurez accès à votre médicament pour ne pas manquer la dose prévue. Ce serait une bonne idée de mettre une alarme à la première heure le matin ou juste avant votre heure de coucher habituelle.

Rappelez-vous de prendre LUMAKRAS exactement comme votre professionnel de la santé vous a dit de le faire.

Pharmacie où je vais chercher mon médicament LUMAKRAS

Pharmacie	Numéro de téléphone	Pharmacien

Médicaments

Nom du médicament	Posologie	Schéma posologique	Forme/ Format	Je prends ce médicament pour...

Ressources de soutien pour les personnes atteintes de cancer

Ressources et coordonnées utiles

Société canadienne du cancer
cancer.ca/fr/
1-888-939-3333

Cancer pulmonaire Canada
cancerpulmonairecanada.ca
1-888-445-4403

Parlons Cancer
parlonscancer.ca
1-888-939-3333

Réseau canadien des survivants du cancer
survivornet.ca/fr/
613-898-1871
info@survivornet.ca

L'Association pulmonaire du Québec
poumonquebec.ca
514-287-7400
info@poumonquebec.ca

Nous espérons que les ressources ci-dessus vous dirigeront vers des gens, des outils et de l'information qui sauront vous soutenir pendant votre traitement. Ces ressources sont suggérées à titre informatif et ne doivent pas remplacer les conseils de votre professionnel de la santé.

Programme VICTOIRE[MD]

(offert par les services de soutien aux patients Amgen Entrust[MD]) pour LUMAKRAS



Le programme VICTOIRE[MD] est un programme d'aide aux patients conçu pour aider les patients comme vous à explorer le processus de remboursement et pour vous offrir des services de soutien supplémentaires.

Les spécialistes en remboursement des médicaments du programme VICTOIRE[MD] sont disponibles pour vous aider à déterminer si vous êtes couvert par un régime d'assurance et si vous êtes admissible à recevoir un remboursement pour **LUMAKRAS**.

Quelles sont les caractéristiques du programme?

- Vous pouvez recevoir de l'aide pour explorer toutes les options de couverture possibles par l'entremise de divers régimes d'assurance médicaments, y compris pour remplir la documentation, comme les formulaires d'autorisation préalable.
- Le programme VICTOIRE[MD] peut s'occuper des démarches nécessaires pour porter en appel les refus de remboursement.
- Vous pouvez demander un soutien financier, par exemple une aide au paiement de la quote-part (lorsque cela est permis).
- Le programme VICTOIRE[MD] peut prendre en charge la coordination du remboursement et de la livraison du médicament au besoin.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme VICTOIRE[MD], communiquez avec un spécialiste en remboursement des médicaments du programme VICTOIRE[MD] au 1-888-706-4717.

PrLUMAKRAS[MD]
comprimés de sotorasib

LUMAKRAS[MD] est une marque déposée utilisée sous licence par Amgen Inc.
VICTOIRE[MD] est une marque déposée détenue ou utilisée sous licence par Amgen Inc.
AMGEN Entrust[MD] est une marque déposée d'Amgen Inc. utilisée sous licence.
© 2026 Amgen Canada Inc. Tous droits réservés.

MEMBRE DE MÉDICAMENTS NOVATEURS CANADA

RÉVISÉ PAR CCPP

CAN-510-0922-80003